

GASTROENTEROLOGÍA DE CARSON VALLEY HEALTH

Instrucciones para la endoscopia superior (EGD)

Lugar del procedimiento:

Carson Valley Health Surgery Center
1107 Highway 395 N
Gardnerville, NV 89410

Fecha del procedimiento: _____

Una endoscopia superior (también llamada “esofagogastroduodenoscopia” [EGD]) le permite al proveedor examinar el revestimiento del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado con una cámara delgada y flexible.

Lo que se puede esperar

Durante el procedimiento, recibirá medicamentos a través de una vía intravenosa para ayudarlo a relajarse y a mantenerse cómodo. Es posible que su proveedor tome pequeñas muestras de tejido (biopsias) durante el procedimiento. Las biopsias son indoloras y con frecuencia se obtienen incluso cuando el revestimiento parece normal.

El procedimiento suele durar entre 10 y 20 minutos, aunque es esperable que permanezca más tiempo en el centro quirúrgico para la preparación y la recuperación.

Preparación para el procedimiento

Tener el estómago completamente vacío es importante para su seguridad. Los alimentos o líquidos que permanecen en el estómago pueden aumentar el riesgo de complicaciones durante la sedación.

El día anterior al procedimiento

Puede comer con normalidad, a menos que su proveedor le proporcione otras instrucciones. Evite las comidas abundantes tarde en la noche, de ser posible.

La medianoche antes del procedimiento

No coma nada después de la **MEDIANOCHE**. Esto incluye:

- X** Alimentos o bebidas de cualquier tipo
- X** Golosinas
- X** Goma de mascar
- X** Pastillas de menta

Puede lavarse los dientes y enjuagarse la boca, pero no debe tragar agua.

GASTROENTEROLOGÍA DE CARSON VALLEY HEALTH

Instrucciones para los medicamentos

Continúe con estos medicamentos

Si toma medicamentos para lo siguiente:

- Presión arterial alta
- Afecciones cardíacas
- Afecciones pulmonares o respiratorias

Tómelos a la hora habitual con un pequeño sorbo de agua, a menos que se le indique lo contrario.

Medicamentos para la diabetes

Si usa insulina o toma medicamentos para la diabetes, comuníquese con nuestro consultorio para recibir instrucciones específicas antes del procedimiento.

Anticoagulantes

Informe al consultorio si usted toma los siguientes:

- Eliquis (apixabán)
- Xarelto (rivaroxabán)
- Coumadin (warfarina)
- Plavix (clopidogrel)
- Brilinta (ticagrelor)
- Lovenox (enoxaparina)
- Cualquier otro anticoagulante

El proveedor determinará si es necesario ajustar estos medicamentos antes del procedimiento.

GASTROENTEROLOGÍA DE CARSON VALLEY HEALTH

IMPORTANTE

No ingiera nada por vía oral

No ingiera alimentos, tome líquidos, mastique goma de mascar, succione caramelos ni ingiera nada por vía oral después de la **MEDIANOCHE**.

Transporte

Durante el procedimiento, recibirá sedación.

Un adulto responsable debe estar disponible para trasladarlo a su casa después del procedimiento. Por seguridad, no puede conducir solo a su casa.

Hora de llegada y duración del procedimiento

El Departamento de Programación de Cirugías se comunicará con usted tres días antes del procedimiento para informarle su hora de llegada exacta y la hora del procedimiento. Por lo general, el procedimiento dura entre 20 y 30 minutos, seguido de un período de recuperación de 30 minutos.

Después del procedimiento

Normalmente, puede regresar al trabajo al día siguiente. No debería tener ninguna restricción, a menos que su proveedor indique lo contrario después del procedimiento.

Después del procedimiento, puede retomar su dieta habitual o comer lo que pueda tolerar después del procedimiento, a menos que su proveedor del servicio de endoscopia indique lo contrario.

¿Tiene alguna pregunta?

Gastroenterología de Carson Valley Health

☎ 775.783.4800

Carson Valley Health Surgical Center

☎ 775.782.1595